



ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງເປົ້າໝາຍຂອງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຂາດສານອາຫານ Progress Against National Nutrition Targets and Severity of Malnutrition

ສາລະວັນ SARAVANE

ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ National Nutrition Indicator	2011/12*	2015**	ແນວໂນ້ມ Trends	ຄວາມຮຸນແຮງ Severity ***	ເປົ້າໝາຍ ປີ 2020, ຍຸດທະສາດແລະແຜນ ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ 2020 Target, NPAN	ເປົ້າໝາຍ ປີ 2025, ຍຸດທະສາດແຫ່ງ ຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2025 Target, NNS	ສົມທຽບ ການປະຕິບັດ ໃສ່ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ Performance against national target
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຂາດສານອາຫານຊ້ຳເຮື້ອ (ເຕັ້ງ) Stunting in CU5 (%) (ເປີເຊັນ)	54.4	43.8	↓	●	34	25	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຂາດສາອາຫານຮຸນແຮງ (ຈ່ອຍ) Wasting in CU5 (%) (ເປີເຊັນ)	8.6	16.4	****	●	< 5	< 5	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ນ້ຳໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ Underweight in CU5 (%) (ເປີເຊັນ)	41.2	37.4	****	●	17	12	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ Anaemia in CU5 (%) (ເປີເຊັນ)	45.7	26.7	↓	●	30	20	ຄາດວ່າຈະບັນລຸ On track
ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ Anaemia in WRA (%) (ເປີເຊັນ)	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ No data	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ No data			23	15	ຍັງຫາຂໍ້ມູນ Data required
ເດັກເກີດໃຫມ່ນ້ຳໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ Low Birth Weight (%) (ເປີເຊັນ)	22.8	20.1	→		11	8	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ Overweight in CU5 (%) (ເປີເຊັນ)	1.3	2.2	****		≤ 2	≤ 2	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track
ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ Exclusive breastfeeding (%) (ເປີເຊັນ)	28	41.4	↑		50	60	ຄາດວ່າຈະບັນລຸ On track
ຂາດສານໄອໂອດີນຂອງເດັກໃນໄວຮຽນ Iodine deficiency in school age children (median UIC µg/l)	<100	ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ No data		●	>100	>100	ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸ Off track

* ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສຳຫລວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2011/12, ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນພະຍາດເລືອດຈາງ (ການສຳຫລວດປະເມີນໂພຊະນາການເວລານ້ຳຖ້ວມ ແລະ ພາຍຸກາດສະນາ ປີ 2008-2009) ແລະ ການຂາດສານໄອໂອດີນ (ມາຈາກການສຳຫລວດ ການໃຊ້ເກືອໄອໂອດີນ ແລະສະພາບການການບໍລິໂພກເກືອໄອໂອດີນ ໃນໂຮງຮຽນປີ 2013)
Source: All data taken from 2011/12 Lao Social Indicator Survey (LSIS), except anaemia (2008-09 Nutritional Assessment in Flood and Typhoon-Ketsana Affected Provinces of Laos) and Iodine deficiency (2013 School-based survey of iodized salt use and status of iodine nutrition in Laos)

** ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫລວດທາງດ້ານມະນຸດວິທະຍາກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ປີ 2015
Source: 2015 Lao Child Anthropometry Assessment Survey (LCAAS)

*** ຈາກອີງການອະນາໄມໂລກ, ການຈັດລຽງລະດັບສຳຄັນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນດັດຊະນີໝາຍ
(ສີແດງ: ວິກິດ/ຮຸນແຮງ/ສູງຫລາຍ; ສີສົ້ມ: ສູງ/ປານກາງ; ສີເຫລືອງ: ກາງ/ອ່ອນ; ສີຂຽວ: ຕໍ່າ/ບໍ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ)
WHO Public Health Significance classification where established for the indicator
red: critical/ severe/ very high; **orange:** high/ moderate; **yellow:** medium/ mild/ poor; **green:** low/ no public health problem

**** ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ ສາຍເຫດຍ້ອນລະດູການ; ປີ 2015 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນລະດູການທີ່ຂາດແຄນອາຫານທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມັນພົວພັນເຖິງການຂາດອາຫານຮ້າຍແຮງສູງ.
Difficult to assess trends due to seasonality issue; 2015 data collected during lean season which is associated with higher levels of acute malnutrition.

↑ ເພີ່ມຂຶ້ນ
Increasing
→ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
No significant change
↓ ຫລຸດລົງ
Decreasing

NPAN: National Plan of Action on Nutrition
WRA: Women of Reproductive Age (15-49 years)
CU5: Children under 5 years of age
UIC: Urinary Iodine Concentration
NNS: National Nutrition Strategy

